

# Für ALLE Fälle!



## Pointer® Plus

HERBIZID

- + Die Universallösung gegen Unkräuter inkl. Kletten-Labkraut
- + Wirkt hervorragend durch die Kombination von drei Wirkstoffen
- + Hochverträglicher Mischpartner, z. B. für Gräserherbizide

<b>Wirkstoffe</b>	83 g/kg Tribenuron-methyl, 83 g/kg Metsulfuron-methyl, 105 g/kg Florasulam	
<b>Formulierung</b>	Homogenes Granulatgemisch aus wasserdispergierbarem Florasulam (WG) und wasserlöslichem Tribenuron-methyl (SG) und Metsulfuron-methyl (SG)	
<b>Wirkstoffgruppe</b>	Metsulfuron-methyl:	Sulfonylharnstoff HRAC 2
	Tribenuron-methyl:	Sulfonylharnstoff HRAC 2
	Florasulam:	Triazolopyrimidin HRAC 2
<b>Wirkmechanismus</b>	ALS-Hemmer, Hemmung des Acetolactat-Synthase-Enzyms	
<b>Wirkstoffaufnahme/-verteilung</b>	Blatt und Boden / systemisch	
<b>Kulturen (Stadien)</b>	Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale, Sommerweizen, Sommergerste & Sommerhafer (BBCH 12–39)	
<b>Indikationen</b>	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel	
<b>Anwendungszeitpunkt / Aufwandmenge</b>	Frühjahr, Nachauflauf, 50 g/ha	
<b>Abstandsauflagen</b> <small>Weitere Auflagen im Tabellenteil</small>	Hang > 2%:	0 m
	Oberflächengewässer	NW 605-1: 5 m (50%); Länderrecht (75 & 90%); NW 606: 5 m
	Saumstrukturen	NT 108: mind. 5 m (75 & 90%); Standard: 25 m
<b>Bienenschutz</b>	Nicht bienengefährlich (B4)	
<b>Gebindegröße</b>	250 g, 1 kg	

### Pointer® Plus – Anwendungsempfehlung

	BBCH 12	13	21	25	30	31	39
<b>Breite Mischverunkrautung inkl. Klettenlabkraut</b>	Pointer® Plus 50 g/ha						
<b>Früher Einsatz</b>							
<b>Breite Mischverunkrautung inkl. Kletten-Labkraut und Ungräser</b>	Pointer® Plus 50 g/ha + Gräserherbizid						
<b>Breite Mischverunkrautung, inkl. Kletten-Labkraut und Ehrenpreisarten</b>	Pointer® Plus 50 g/ha + Aurora® 40 g/ha						

Von früh  
bis spät:  
BBCH 12 bis  
BBCH 39!

**Praxistipp:**


Früh einsetzen,  
Tankmischungen mit  
einem Gräserherbizid  
sind möglich!

**Frühe Anwendung**

Wir raten im Frühjahr in Wintergetreide zu einer frühen Anwendung, wenn im Herbst keine Unkrautbekämpfung durchgeführt wurde. Pointer® Plus lässt sich sehr gut mit einem Gräserherbizid anwenden. Die Tankmischung ist sehr breit wirksam gegen Unkräuter und Gräser.

Auch für Nachbehandlungen im Frühjahr empfehlen wir eine rechtzeitige Anwendung, um hohe Wirkungsgrade zu erreichen.

**Pointer® Plus – Wirksamkeit im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten in der frühen Anwendung**



■ Pointer® Plus (50g/ha) ■ Vergleichsprodukt 1 (200ml/ha) ■ Vergleichsprodukt 2 (70g/ha + 1l/ha) Quelle: FMC Feldversuche



Kamille



Klette



Storchschnabel



Klatsch-Mohn



Taubnessel



Vogelmiere



Hellerkraut



Ausfallraps



Hirtentäschel



Gänsefuß