

Das starke Basisherbizid für eine breite Unkrautbekämpfung im Mais

WIRKSTOFF (HRAC)

600 g/l Pyridat (6)

FORMULIERUNG

Emulsionskonzentrat (EC)

ANWENDUNGSZEITPUNKT

Früher Nachauflauf BBCH 12 bis 18

AUFWANDMENGE

1,5 l/ha oder Splitting (2 x 0,75 l/ha, Abstand mind. 7 Tage)

AUFLAGEN

NG405, NT 101, NW607-1 (-*/-*/-*/20)

0,75 l/ha oder Splitting: NW607-1 (-*/-*/-*/10)

GEBINDEGRÖßE

5 L Kanister



Unkraut	Onyx®1,5 l/ha
Ackergauchheil (bis 2 Blatt)	●●●●
Acker Hohlzahn	●●●●
Acker Hahnenfuß	●●
Acker Ochsenzunge	●●●●
Ackersteinsame	●●●●
Amarant-Arten	●●●●
Ampferblättriger Knöterich	●
Ambrosia	●●
Bingelkraut	●●
Echter-Erdrauch	●●●●
Ehrenpreis	●●
Franzosenkraut-Arten	●●●●
Gänsefuß-Arten	●●●●
Gänsedistel	●●●●
Gemeiner Stechapfel	●●●●
Gemeines Kreuzkraut	●●●●

Unkraut	Onyx®1,5 l/ha
Gemeiner Rainkohl	●●●●
Gewöhnliches Greiskraut	●●●●
Hirtentäschelkraut	●●
Kamille-Arten	●●
Kleine Brennnessel (bis 2 Blatt)	●●
Klettenlabkraut	●●●
Kreuzkraut	●●●●
Melde-Arten	●●
Schwarzer Nachtschatten	●●●●
Samtpappel (bis 2 Blatt)	●●
Sonnenblume	●●
Taubnessel-Arten	●●●●
Vogelmiere (bis 2-Blattstadium)	●●●●
Wicken	●●
Windknöterich	●●
Wolfsmilch	●●●

●●●● = Sehr gute Wirkung; ●●● = Gute Wirkung; ●● = Mittlere Wirkung; ● = Geringe Wirkung


Anwendungsempfehlung :

Spritzfolge gegen Unkräuter inkl. Hirse-Arten, Durchwuchskartoffeln und Erdmandelgras



Zusätzlich Gräser?
Mischbar mit Motivell® forte
oder einem Rimsulfuron Produkt.

*: Bei Bedarf





Onyx®-Ideal auch in Kombination mit Dicamba oder Fluroxypyr für Nachbehandlungen

Unkraut	Onyx®0,5 –0,75 l/ha	
	+ 0,2 kg/ha Dicamba (700 g AI/kg)*	od. + 0,4 l/ha Fluroxypyr (200 g AI/l)*
Ackergauchheil	●●●●	●●●●
Ackerhellerkraut	●●●●	●●●●
Ackerhohlzahn	●●●●	●●●●
Ackerkratzdistel	●●●●	●●
Ackerwinde	●●●●	●●●●
Amarant	●●●●	●●●●
Ampfer	●●●	●●●
Ausfallraps	●●●●	●●●●
Franzosenkraut	●●●	●●●●
Bingelkraut	●●●●	●●
Gänse-distel	●●●●	●●●●
Gänsefuß Weißer-	●●●●	●●●
Gemeiner Erdrach	●●●	●●●●
Kamille Echte	●●	●●

Unkraut	Onyx®0,5 –0,75 l/ha	
	+ 0,2 kg/ha Dicamba (700 g AI/kg)*	od. + 0,4 l/ha Fluroxypyr (200 g AI/l)*
Kamille Geruchlose	●●	●●
Franzosenkraut	●●●●	●●●●
Klettenlabkraut	●●●	●●●●
Knöterich Ampferblätt.	●●	●●
Knöterich Floh-	●●●	●●
Knöterich Vogel-	●●	●●
Knöterich Winden-	●●●	●●●●
Kornblume	●	●
Kreuzkraut	●●●●	●●●●
Melde-Arten	●●●●	●●
Samtpappel	●●●●	●●
Schw. Nachtschatten	●●●●	●●●●
Vogelmiere	●●●●	●●●●

●●●● = Sehr gute Wirkung; ●●● = Gute Wirkung; ●● = Mittlere Wirkung; ● = Geringe Wirkung

*: Zulassungen der jeweiligen Produkte beachten!


Anwendungsempfehlung :

Ideal auch für Nachspritzungen gegen Ackerwinde, Disteln, Ampfer und breiter Mischverunkrautung.

Je nach Partner bis zum 6 oder 8 Blattstadium.

0,5 –0,75 l/ha **Onyx®**
+ z. B. 0,2 kg/ha Dicamba 700

0,5 –0,75 l/ha **Onyx®**
+0,4 l/ha Fluroxypyr(200 g AI/L)



©, TM - registrierte Warenzeichen der Hersteller. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanleitungen und gelten nur für das Vertriebsgebiet Deutschland. Stand: Januar 2024